



3483000

3484000

3485000

3486000

7204000

7203000

7202000

7201000

7200000

7204000

7203000

7202000

7201000

7200000

TUU-11-081

Puoliväinharju

Koirakumpu

Koirakoski

Rexisuo

Iseänkangas

Huouseuslänkä

Pakosaunama

Huosiolampi

Huouseuslampi

Iso-Huouseus

Kettokangas

Kassarakangas

Kassaranlampi

Jokisuo

Multiharju

Korkiakangas

Pirhola

Keihässuo

PUOLIVÄLINKANGAS

Ylikiiminki

Tietokantatunnus: TUU-11-081

Arvoluokka: 4

Muodostuma: Rantakerrostuma

Pinta-ala: 105,3 ha

Korkeus: 123 m mpy.

Karttalehti: 3424 08

Alueen suhteellinen korkeus: 14 m

Muodon suhteellinen korkeus: 2 m

Sijainti: Puolivälinkankaan muodostuma sijaitsee Ylikiimingin ja Utajärven rajalla, noin kuusi kilometriä Yli-Vuotosta kaakkoon.

Geologia

Muodostuma on harjun länsirinteelle syntynyt rantakerrostuma. Alue peittyi mannerjäätikön reunan perääntyessä alueelta noin 10 600 vuotta sitten muinaisen Itämeren Ancyclusjärveksi kutsutun vaiheen peittoon. Maankohoamisen seurauksena Puolivälinkankaan (123 m mpy.) laki paljastui veden peitosta noin 9 100 vuotta sitten. Harjun länsipuolella sijaitseva Hevoskankaan drumliini oli tuolloin saari, joka suojasi harjua länsilounaisten tuulten nostamalta aallokolta, joten aallokko huuhtoi voimakkaimmin harjun lakea ja länsirinteitä. Aallokko kerrosti irrottamansa karkeimman aineksen harjun laelle kahdeksi matalaksi ja epäyhtenäiseksi valliksi. Hienomman aineksen aallokko kerrosti länsirinteen alaosassa olevalle loivalle tasanteelle. Maankohoamisen seurauksena tasanteelle muodostui sarja allekkaisia rantavalleja, joiden suuntaus on pohjoisesta etelään eli lähes poikittainen harjuselänteen kulkuun nähden. Rantavallit ovat muodoltaan loivapiirteisiä ja niiden korkeus on 0,5-1,5 metriä.

Biologia

Alueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Ilmakuvan mukaan alueen metsät on laajalti harvennushakattu ja osin aukkohakattu. Nykyinen puusto on taimikkoa tai kasvatusmännikköä. Kenttäkerros on puolukka-, kanerva- sekä poronjäkälälaikkuinen.

Maisema ja muut arvot

Muodostuman mataluudesta ja peittävästä puustosta johtuen rantakerrostuma hahmottuu vain lähialueelle. Samasta syystä sitä siltä avautuu metsä- ja suomalaisema vain lähiympäristöön. Muodostuman sisäiseen maisemaan tuovat hieman vaihtelua rantavallit ja niiden väliset matalat painanteet.

Kirjallisuus: