



UNIVERSITY OF HELSINKI



<https://helda.helsinki.fi>

Geenitestit ja lääkehoito

Tarkiainen, Katriina

Suomen lääkäriliitto
2021

Tarkiainen , K , Lehtisalo , M & Niemi , M 2021 , ' Geenitestit ja lääkehoito ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 76 , Nro 1-2 , Sivut 56-59 . < <https://www.laakarilehti.fi/pdf/2021/SLL12021-56.pdf> >

<http://hdl.handle.net/10138/327558>

publishedVersion

Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.

This is an electronic reprint of the original article.

This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Please cite the original version.

Geenitestit ja lääkehoito

Lääkehoitoihin vaikuttavien geenien tutkiminen voi auttaa suunnittelemaan potilaalle sopivan lääkehoidon ja ehkäisemään lääkehoitojen haittavaikutuksia tai parantamaan hoidon tehoa.

Yksilöiden välistä vaihtelua lääkkeiden vaikutuksissa selittävät yleisesti monet tekijät, kuten ikä, sukupuoli, tupakointi ja muu päihteiden käyttö, sairaudet sekä lääkkeiden yhteisvaikutukset. Merkittävä osa vaihtelusta kuitenkin liittyy perinnöllisiin tekijöihin. Farmakogenetiikka tutkii yksilöiden välisten perinnöllisten erojen vaikutusta lääkkeiden tehoon ja haittavaikutuksiin.

Geneettiset erot voivat vaikuttaa lääkkeiden vaikutuksiin monella tavalla (kuvio). Nykyään on tiedossa kymmeniä lääkkeitä, joihin potilaan perimä vaikuttaa kliinisesti merkittävästi. Suomalaisista yli 95 %:lla on vähintään yhdessä lääkehoitoon vaikuttavassa geenissä kliinisesti merkittävä muunnos (taulukot). Perintötekijöiden huomioimisesta lääkehoitojen yhteydessä on laadittu kansainvälisiä hoitosuosituksia, ja tietoa on myös joidenkin lääkkeiden valmisteyhteenvedoissa.

Seuraavassa esitellään muutamia esimerkkejä lääkkeistä, joita käytettäessä

Merkittävä osa lääkkeen vaikutusten vaihtelusta liittyy perinnöllisiin tekijöihin.

farmakogeneettisestä testauksesta on havaittu tutkimusnäytön perusteella olevan hyötyä.

CYP2C19 ja klopidogreeli

Klopidogreeli on yleisesti käytetty anti-tromboottinen lääke. Vain pieni osa (noin 10 %) siitä metaboloituu elimistössä sytokromi P450 (CYP)-entsyymien välityksellä aktiiviseksi metaboliitiksi. Klopidogreelin farmakokinetiikassa ja tehossa on suuria eroja yksilöiden välillä, ja jopa 75 %

niistä selittyy perinnöllisillä eroilla.

CYP2C19-entsyymin aktiivisuutta heikentävät perinnölliset muunnokset vähentävät klopidogreelin aktiivisen metaboliitin muodostumista, mikä johtaa puutteelliseen lääkehoitoon. Perinnöllisesti normaalia hitaammilla tai hitailla CYP2C19-metaboloijilla on klopidogreelin puutteellisen tehon vuoksi lisääntynyt riski saada esimerkiksi vakavia sydäntapahtumia pallolaajenuksen jälkeen ja uusi aivoinfarkti aivoinfarktin jälkeen.

Normaalia hitaammille ja hitailla CYP2C19-metaboloijille on suositeltavaa aloittaa klopidogreelin asemesta vaihtoehtoinen lääke (1).

Lääkevasteeseen vaikuttavat perinnölliset muutokset

Farmakokinetiikkaan vaikuttavat geenit Esimerkiksi CYP2D6, DPYD, SLC01B1, TPMT, UGT1A1	Farmakodynamiikkaan vaikuttavat geenit Esimerkiksi VKORC1
Lääkevasteeseen vaikuttavat geenit	
Farmakologiaan liittymättömät, haittavaikutuksille altistavat geenit Esimerkiksi HLA-B*15:02	Sairauden riskiin tai etenemiseen vaikuttavat geenit Esimerkiksi CFTR, HER2-yli-ilmentymä

Klopidogreelin käyttö varsinkin sydäninfarktin pallolaajennushoidon yhteydessä on vähentynyt sen vaihtelevan tehon vuoksi. Hoidon teho voitaisiin kuitenkin turvata varmistamalla potilaan genotyyppi ennen klopidogreelilääkityksen aloittamista.

Viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa verrattiin ST-nousuinfarktin pallolaajennushoidon yhteydessä genotyyppiohjattua trombosyyttiestäjähoitoa standardihoitoon (2). Genotyyppiohjatussa ryhmässä normaalia hitaammille ja hitaille CYP2C19-metaboloijille (40 % potilaista) valittiin hoidoksi joko tikagrelori tai prasugreeli, ja lopuille (60 % potilaista) aloitettiin klopidogreeli. Standardihoitoryhmässä trombosyyttiestäjä valittiin paikallisen hoitokäytännön mukaan ja vain 8 % potilaista sai klopidogreeliä. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhdistelmämuuttujaa, johon kuului pääte- tapahtumina sydäninfarkti, stenttitromboosi, aivoinfarkti, verenvuoto ja kuolema mistä tahansa syystä, sekä verenvuodot omana pääte- muuttujanaan. Genotyyppiohjattu hoito oli yhdistelmämuuttujan suhteen yhdenvertainen standardihoidon kanssa, ja vuotokomplikaatioita oli vähemmän.

Klopidogreelistä on jo laajasti saatavilla edullisempia generiisiä valmisteita, joten genotyyppiohjattu trombosyyttiestäjähoito pienentäisi myös hoidon kustannuksia.

CYP2C19, CYP2D6 ja masennuslääkkeet

Perinnöllinen vaihtelu CYP2C19- ja CYP2D6-entsyymien aktiivisuudessa voi vaikuttaa tiettyjen masennuslääkkeiden pitoisuuksiin ja vasteeseen kliinisesti merkittävässä määrin. Tämä on huomioitu myös uusimmassa depression Käypä hoito -suosituksessa. CYP2C19-genotyyppi voi vaikuttaa sitalopraamin, essitalopraamin ja sertraliinin pitoisuuksiin ja vaikutuksiin sekä osaan trisyklisistä masennuslääkkeistä (3,4). CYP2D6-genotyyppi puolestaan voi vaikuttaa paroksetiin, fluvoksamiinin ja trisykliin masennuslääkkeisiin.

Lääkeaineiden farmakokinetiikkaan ja farmakodynamiikkaan vaikuttavia geenejä

Lääkeaineiden farmakokinetiikkaan ja farmakodynamiikkaan vaikuttavia geenejä ja niiden aktiivisuuteen vaikuttavien genotyyppien esiintyvyyksiä väestöissä (8,9). Kun aktiivisuus on lisääntynyt, henkilö on normaalia nopeampi metaboloija, ja kun aktiivisuus on voimakkaasti lisääntynyt, henkilö on erittäin nopea metaboloija. Kun aktiivisuus on vähentynyt, henkilö on normaalia hitaampi metaboloija, ja kun aktiivisuus puuttuu, henkilö on hidas metaboloija. N/A, muunnoksen esiintyvyydestä ei ole tietoa väestötasolla. CYP = sytokromi P450, DPYD = dihydropyrimidiinidehydrogenaasi, SLCO1B1 = solute carrier organic anion transporter 1B1 - kuljetusproteiini, TPMT = tiopuriini-S-metyyli-ransferaasi, VKORC1 = K-vitamiiniepoksidireduktaasin alayksikkö 1.

Geeni	Perinnöllinen aktiivisuus	Esiintyvyys väestössä				Esimerkilääkkeitä, joihin geenimuunnoksilla on kliinisesti merkittävä vaikutus
		suomalaiset %	eurooppalaiset %	itäaasialaiset %	afrikkalaiset %	
CYP2C9	Normaali	67	68	93	74	Fenytoiini
	Vähentynyt	30	29	7	24	Tulehduskipulääkkeet
	Puuttuva	3	3	0,1	2	Varfariini
CYP2C19	Voimakkaasti lisääntynyt	4	5	< 0,1	6	Amitriptyliini
	Lisääntynyt	22	26	2	23	Essitalopraami
	Normaali	33	35	37	25	Klopidogreeli
	Vähentynyt	36	30	47	39	Lansopratsoli
	Puuttuva	5	3	14	7	Omepratsoli
CYP2D6	Voimakkaasti lisääntynyt	7	3	1	14	Pantopratsoli
	Normaali	62	54	13	48	Sertraliini
	Vähentynyt	29	37	85	35	Sitalopraami
	Puuttuva	3	6	0,5	3	Vorikonatsoli
CYP3A5	Normaali	0,5	0,3	8	44	Amitriptyliini
	Vähentynyt	13	10	41	44	Atomoksetiini
	Puuttuva	86	89	51	11	Notriptyliini
DPYD	Normaali	93	94	99,9	99	Kodeiini
	Vähentynyt	7	6	< 0,1	1	Ondansetroni
	Puuttuva	0,1	0,04	< 0,1	< 0,1	Paroksetiini
SLCO1B1	Normaali	60	64	56	94	Tamoksifeeni
	Vähentynyt	35	31	37	6	
	Puuttuva	5	4	6	0,1	
TPMT	Normaali	N/A	91	96	85	Takrolimuusi
	Vähentynyt	N/A	8	3	10	5-fluorourasiili
	Puuttuva	N/A	0,2	< 0,1	0,3	Kapesitabiini
VKORC1	Normaali	37	40	1	81	Tegafuuri
	Vähentynyt	48	47	18	18	Atsatiopriini
	Puuttuva	15	14	81	1	Merkaptopuriini
						Tioguanini
						Varfariini

Perinnöllisesti hitailta metaboloijilta entsyymiaktiivisuus puuttuu kokonaan. Sen vuoksi lääkkeiden pitoisuudet eli-

mistössä voivat näillä potilailla nousta tavallista suuremmiksi, mikä altistaa haittavaikutuksille. Kansainvälisen klii-

Lääkkeiden haittavaikutuksille altistavia geenimuunnoksia

Lääkkeiden haittavaikutuksille altistavien geenimuunnosten esiintyvyyksiä eri väestöissä (8,10).
N/A = muunnoksen esiintyvyydestä ei ole tietoa väestötasolla. F5 = hyytymistekijä V, HLA-B = human leukocyte antigen B -proteiini

Geeni	Riskialleelin kantajat	Esiintyvyys väestöissä				Esimerkilääkkeitä, joihin geenimuunnoksilla on kliinisesti merkittävä vaikutus
		suomalaiset %	eurooppalaiset %	itäaasialaiset %	afrikkalaiset %	
F5	Heterotsygoottiset	4	6	< 0,1	0,8	Estrogeeniä sisältävä hormonaalinen ehkäisy ja hormonikorvaushoito
	Homotsygoottiset	0,05	0,1	< 0,1	< 0,1	
HLA-B*15:02	Heterotsygoottiset	N/A	0,1	22	9	Fenytoiini Karbamatsepiini Okskarbatsepiini
	Homotsygoottiset	N/A	< 0,1	2	0,2	
HLA-B*57:01	Heterotsygoottiset	3	11	2	0,7	Abakaviiri Flukloksasilliini
	Homotsygoottiset	0,03	0,3	< 0,1	< 0,1	
HLA-B*58:01	Heterotsygoottiset	N/A	5	24	3	Allopurinoli
	Homotsygoottiset	N/A	< 0,1	2	< 0,1	

nisen farmakogenetiikan implementaatiokonsortion (CPIC) suosituksen mukaan läikehoito tulisi hitaille metaboloijille aloittaa tavanomaista pienemmällä annoksella tai vaihtoehtoisesti valita lääke, joka metaboloituu pääasiassa toisen entsyymin välityksellä.

Normaalia nopeammilla ja erityisesti nopeilla metaboloijilla pitoisuudet voivat puolestaan olla tavallista pienempiä, jolloin teho voi jäädä puutteelliseksi tavanomaisilla annoksilla. Suomalais-tutkimuksessa tutkittiin *CYP2C19*-genotyyppien esiintyvyyttä sitalopraamia tai essitalopraamia käyttäneillä itsemurhan tehneillä potilailla (5). Erittäin nopea *CYP2C19*-genotyyppi oli yliedustettuna itsemurhan tehneiden joukossa, mikä sopii mahdolliseen sitalopraamin ja essitalopraamin tavallista

pienempään pitoisuuteen ja heikompaan tehoon. Erittäin nopeiden *CYP2C19*- tai *CYP2D6*-metaboloijien hoidossa suositellaan käytettäväksi lääkettä, jonka metabolia ei riipu näistä entsyymeistä.

Olisi järkevää tutkia kerralla kaikki tärkeimmät läikehoitoihin vaikuttavat geenimuunnokset.

SLCO1B1 ja statiinit

Lihashaittavaikutukset lievistä ja melko yleisestä lihaskivusta harvinaiseen mutta potentiaalisesti hengenvaaralliseen rabdomyolyyysiin ovat statiinihoidossa tunnettuja. Niille altistavat statiinin suuri annos, läikeyhteisvaikutukset sekä potilaan korkea ikä ja monet yhtäaikaisten sairauksien lisäksi perinnöllisistä syistä suurentunut riski statiinien lihashaittoille.

SLCO1B1-geeni koodaa OATP1B1-proteiinia, joka kuljettaa statiineja verenkierrasta maksasoluihin. Sen perin-

nölliset muunnokset heikentävät proteiinin kuljetusaktiivisuutta, mikä voi nostaa monien statiinien pitoisuuksia plasmassa.

Eryteisesti tämä vaikutus koskee simvastatiinia: aktiivisen simvastatiinihapon pitoisuudet plasmassa voivat nousta yli kolminkertaisiksi henkilöillä, joilla OATP1B1:n toiminta on perinnöllisesti heikentynyt. Näille potilaille suositellaan valitsemaan simvastatiinin sijaan toinen statiini. Vaihtoehtoisesti simvastatiinihoito voidaan aloittaa tavallista pienemmällä annoksella ja suurentaa annos maksimissaan 20 mg:aan vuorokaudessa (6).

SLCO1B1-geenimuunnokset voivat kuitenkin suurentaa myös muiden statiinien, kuten atorvastatiinin ja lovastatiinin, pitoisuuksia ja tämän vuoksi mahdollisesti lihashaittojen riskiä.

DPYD ja fluoropyrimidiinit

Fluoropyrimidiinit ovat keskeisiä monien kiinteiden syöpien, kuten rintasyövän sekä suolistosyöpien, hoidossa. *DPYD*-geeni koodaa dihydropyrimidinidehydrogenaasientsyymiä (DPD), joka metaboloii fluoropyrimidiinilääkkeitä. DPD-entsyymin aktiivisuutta heikentävät perinnölliset muunnokset lisäävät fluoropyrimidiinien aiheuttamien vakavien ja kuolemaan johtavien haittavaikutusten riskiä.

Fluoropyrimidiinit suositellaan aloittamaan tavanomaista pienemmällä annoksella henkilöille, joilla todetaan vähentynyt DPD:n aktiivisuus. Niiden käyttöä suositellaan välttämään kokonaan henkilöillä, joilla todetaan puuttuva DPD:n aktiivisuus (7).

DPYD-genotyyppien määrittäminen on laajassa kliinisessä käytössä, koska ennakkoivan *DPYD*-testauksen on todettu lisäävän potilasturvallisuutta ja vähentävän hoidon kokonaiskustannuksia.

Tulevaisuuden näkymiä

Farmakogeneettisiä geenimuunnoksia on toistaiseksi tutkittu pääasiassa yhtä läikehoitoa varten kerrallaan. Olisi kuitenkin järkevää tutkia potilaalta kerralla

kaikki tärkeimmät lääkehoitoihin vaikuttavat geenimuunnokset ja tallentaa tiedot jatkoa varten helposti hyödynnettävään muotoon. Ennakoiva testaus olisi myös kustannustehokasta, koska ker- taalleen tehdyn tutkimuksen tulokset ovat jatkossa käytettävissä tarpeen mukaan. Lääkehaitat aiheuttavat merkittä- viä kustannuksia terveydenhuololle, ja tieto potilaan kliinisesti merkittävästä genotyypistä voi auttaa ennakoimaan ja estämään haittoja.

Potilaat teettävät myös omatoimisesti yhä enemmän erilaisia geenitutkimuk- sia. Helena Kääriäinen ja Kristiina Aittomäki kuvasivat Duodecim-lehdes- sä, miten netistä tilattavien geenitestien myötä on syntynyt toimintaa, jossa ter- veydenhuollon ulkopuolinen toimija sel- littää tulosten merkitystä tutkitun ter- veydelle ja arvioi jatkotoimenpiteiden tarvetta. Harkinta lääkityksen muutta- misesta farmakogeneettisen testin tu- losten perusteella kuuluu aina hoitava- lle lääkärille. Potilaan itse hankkiman testin tuloksia tulkittaessa olisi lisäksi tärkeää varmistaa, että tutkimuksen teh- nyt laboratorio on akkreditoitu, tutki- mukset on tehty validoiduilla menetel- millä ja menetelmä kattaa relevantit geenimuunnokset. Saadut tulokset tuli- si varmentaa terveydenhuollossa, jos niillä on vaikutusta potilaan lääkehoi- toon.

Farmakogeneettiset testit yleistyvät, ja niiden tulkinta ja hyödyntäminen ter-

veydenhuollossa helpottuu esimerkiksi lääkärin päätöksenteon tuen avulla. Farmakogenetiikkaa koskevissa kysy- myksissä lääkärit voivat myös kääntyä kliinisen farmakologian erikoisalan puoleen.

Näyttöön perustuvia suosituksia perinnöllisten muunnosten huomioimi- sesta lääkeshoidossa laativat esimerkiksi kansainvälinen Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium ja hol- lantilainen Dutch Pharmacogenetics Working Group. Myös Suomeen olisi hyvä saada riippumaton taho, joka laati- si kansallisia suosituksia farmakoge- neettisten testien sisällöstä, käytöstä ja tulosten tulkinnasta. Nykytilanteessa testien käyttö ja tulkinta voivat riippua muun muassa paikallisesta saatavu- desta ja tulkinnan tuottajasta. Potilailla tulisi olla yhdenvertainen oikeus asialli- seen farmakogeneettiseen tietoon ja sen yhdenmukaiseen tulkintaan. ●

KATRIINA TARKIAINEN

LT, kliinisen farmakologian erikoislääkäri
HUS Diagnostiikkakeskus, kliininen farmakologia

MINNA LEHTISALO

LL, erikoistuva lääkäri
HUS Diagnostiikkakeskus, kliininen farmakologia

MIKKO NIEMI

LKT, farmakogenetiikan professori, ylilääkäri
Helsingin yliopisto ja HUS Diagnostiikkakeskus,
kliininen farmakologia

KIRJALLISUUTTA

- 1 Scott SA, Sangkuhl K, Stein CM ym. Clinical Pharma- genetics Implementation Consortium guidelines for CYP2C19 genotype and clopidogrel therapy: 2013 update. *Clin Pharmacol Ther* 2013;94:317–23.
- 2 Claassens DMF, Vos GJA, Bergmeijer TO ym. A genotype- guided strategy for oral P2Y12 inhibitors in primary PCI. *N Engl J Med* 2019;381:1621–31.
- 3 Hicks JK, Bishop JR, Sangkuhl K ym. Clinical Pharmaco- genetics Implementation Consortium (CPIC) guideline for CYP2D6 and CYP2C19 genotypes and dosing of selective serotonin reuptake inhibitors. *Clin Pharmacol Ther* 2015;98:127–34.
- 4 Hicks JK, Sangkuhl K, Swen JJ ym. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline (CPIC) for CYP2D6 and CYP2C19 genotypes and dosing of tricyclic antidepressants: 2016 update. *Clin Pharmacol Ther* 2017;102:37–44.
- 5 Rahikainen AL, Vauhkonen P, Pett H ym. Completed suicides of citalopram users—the role of CYP genotypes and adverse drug interactions. *Int J Legal Med* 2019;133:353–63.
- 6 Ramsey LB, Johnson SG, Caudle KE ym. The Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for SLC01B1 and simvastatin-induced myopathy: 2014 update. *Clin Pharmacol Ther* 2014;96:423–8.
- 7 Amstutz U, Henricks LM, Offer SM ym. Clinical Pharma- genetics Implementation Consortium (CPIC) guideline for dihydropyrimidine dehydrogenase genotype and fluoropyrimidine dosing: 2017 update. *Clin Pharmacol Ther* 2018;103:210–6.
- 8 Karczewski KJ, Francioli LC, Tiao G ym. The mutational constraint spectrum quantified from variation in 141,456 humans. *Nature* 2020;581:434–43.
- 9 Zhou Y, Ingelman-Sundberg M, Lauschke VM. Worldwide distribution of cytochrome P450 alleles: a meta-analysis of population-scale sequencing projects. *Clin Pharmacol Ther* 2017;102:688–700.
- 10 Zhou Y, Krebs K, Milani L, Lauschke VM. Global frequencies of clinically important HLA alleles and their implications for the cost-effectiveness of preemptive pharmacogenetic testing. *Clin Pharmacol Ther*, verkossa ensin 14.6.2020. doi: 10.1002/cpt.1944

SIDONNAISUODET

Katriina Tarkiainen, Minna Lehtisalo, Mikko Niemi:
Ei sidonnaisuuksia.